

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРИВИВКИ МАЛЕНЬКИМ ДЕТЯМ?



ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА - самое эффективное средство предотвращения инфекционных заболеваний у детей

ВАКЦИНАЦИЯ = АКТИВАЦИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Формирование антител к возбудителям инфекций и активация иммунитета малыша лучше, чем ослабление иммунной системы мощным микробом и дальнейшее поражение систем организма ребенка. Именно это происходит, если не проводить своевременную вакцинацию.

ВСЕ ДЕТИ В НАШЕЙ СТРАНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВИТЫ ПРОТИВ:

- туберкулеза
- вирусного гепатита В
- дифтерии
- коклюша
- столбняка
- полиомиелита
- кори
- гриппа
- краснухи
- пневмококковой инфекции
- гемофильной инфекции
- эпидемического паротита



ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

Привить детей можно в детской поликлинике по месту жительства



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

ВИД ПРИВИВКИ	ВОЗРАСТ РЕБЕНКА
Первая вакцинация против вирусного гепатита В	в первые сутки жизни
Вакцинация против туберкулеза (БЦЖ-М)	на 3-7 день жизни
Вторая вакцинация против вирусного гепатита В	1 месяц
Первая вакцинация от пневмококковой инфекции	2 месяца
Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС)	3 месяца
Первая вакцинация против полиомиелита	
Первая вакцинация против гемофильной инфекции	
Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС)	4,5 месяца
Вторая вакцинация против полиомиелита	
Вторая вакцинация против гемофильной инфекции	
Вторая вакцинация от пневмококковой инфекции	
Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС)	6 месяцев
Третья вакцинация против полиомиелита	
Третья вакцинация против гемофильной инфекции	
Третья вакцинация против вирусного гепатита В	
Вакцинация против кори, эпидемического паротита, краснухи (КПК)	1 год
Ревакцинация от пневмококковой инфекции	15 месяцев
Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка	18 месяцев
Первая ревакцинация против полиомиелита	
Вторая ревакцинация против полиомиелита	20 месяцев
Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита	6 лет
Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка (АДС)	6-7 лет
Ревакцинация против туберкулеза	7 лет
Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка	14 лет
Третья ревакцинация против полиомиелита	

ВАЖНО!

Прививки делаются после осмотра педиатра и с письменного согласия родителей

НА ЧТО ВЛИЯЕТ ОТКАЗ ОТ ПРИВИВОК?

- У ребенка появляется высокий риск заражения заболеваниями, от которых не сделаны прививки. Болезнь может протекать в более тяжелой форме и с осложнениями, в отличие от привитых детей.
- Родителям могут отказать в приеме ребенка в детские образовательные и оздоровительные учреждения, в том числе и в детский сад.
- Для въезда в ряд стран требуется наличие определенных прививок в соответствии с международными соглашениями и медико-санитарными правилами.

