

Что такое иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)?


Иксодовый клещевой боррелиоз – инфекционное заболевание, вызываемое спирохетами (боррелиями) и передающееся клещами. Поражаются различные системы организма – нервная, сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат.

Сезонность заболевания связана с периодами активности клещей – весна, осень. **Заражение происходит при укусе клеша, с его слюной.**




Центр
Общественного
Здоровья

и Медицинской Профилактики
Пермский край



Пути передачи:

Восприимчивость человека к боррелиям очень высока. От больного здоровому человеку инфекция не передается. Заражение происходит во время посещения леса, в ряде городов – в лесопарках внутри городской черты.



Симптомы:

Первый этап:

- Недомогание;
- Повышение температуры тела;
- Головная боль;
- Тошнота;
- Общая слабость;
- Чувство стягивания и нарушения чувствительности в области укуса клеща;
- Боль в суставах;
- На месте укуса клеща появляется покраснение, отек (эритема), окруженная валиком.

Второй этап характеризуется осложнениями со стороны нервной и сердечно-сосудистой системы:


- Появляются признаки серозного менингита: головная боль, тошнота, рвота, светобоязнь.
- Со стороны сердца – неприятные ощущения, перебои сердечных сокращений.



Профилактика:

Неспецифические меры профилактики сводятся к предупреждению присасывания клещей, а также их раннему удалению:

- использование защитной одежды с длинными рукавами и штанами светлого цвета при посещении лесных биотопов с высокой травой и кустарником;
- применение репеллентов;
- само- и взаимоосмотры на выходе из лесного массива и на привалах.



Что делать, если Вас укусил клещ:

При обнаружении клеша на кожных покровах незамедлительно обратиться в травматологический пункт за помощью;
Сдать клеша в вирусологическую лабораторию для исследования.